
Segnalazioni floristiche n. 21

21 - *Thelephora anthocephala* (Bull.: Fr.) Pers. (Basidiomycetes Aphyllophorales Thelephoraceae)

BREITENBACH & KRANZLIN, 1986, Champignons de Suisse, tome 2: 218.

Reperto – Ravenna, Lido di Dante, in giardino privato a pochi passi dal mare Adriatico, su terreno sabbioso ricco di sostanza organica, sotto siepe di *Ligustrum* sp., 30.IX.1996, leg. G. Pezzi.

Osservazioni – Si tratta del reperto citato in PEZZI (1997, Quad. Studi Nat. Romagna, 8: 1-4) sotto il binomio *Thelephora caryophyllea* (Schaeffer: Fries) Fries. L'iconografia citata di CETTO (1979, I funghi dal vero, vol. 3, fig. 1169) risulta errata per l'indicazione a lato riportata, appunto *T. caryophyllea*; la foto corrisponde all'aspetto del reperto, ma esso va correttamente inquadrato sotto il taxon *T. anthocephala*, riportato in BREITENBACH & KRANZLIN (l.c.), la cui raffigurazione peraltro non corrisponde in pieno al reperto, che secondo gli stessi autori rappresenterebbe forse la forma *repens* Bourd. & Galz. stante il portamento cespitoso del basidioma e non clavarioide come nella forma raffigurata nel testo. Le differenze microscopiche fra i taxa citati (ed anche rispetto ad altre specie del genere) sono praticamente irrilevanti, mentre l'aspetto morfologico di *T. anthocephala* e *T. caryophyllea* può essere ben osservato nella recente opera di LANCONELLI, BALLANTI & RAVA (1998, Funghi del lughese, Edit Faenza). Le descrizioni fatte in PEZZI (l.c.) rimangono comunque valide e, pur sotto altro binomio, la citazione del ritrovamento risulta essere la prima per la Romagna. Stante l'importanza dei caratteri morfologici dei carpofori rispetto alla microscopia per la separazione delle specie di *Thelephora*, ritengo non infondata la possibilità di poter separare la forma in oggetto come specie a sé stante, in quanto risulta ben caratterizzata.

Giorgio Pezzi

via L. Ariosto, 5 - 48020 Villanova di Bagnacavallo (RA)

Segnalazioni faunistiche n. 28-36

28 - *Lepas hilli* (Leach, 1818) (Crustacea Thoracica Lepadidae)

ARGANO et al., 1995, Crustacea Maxillopoda, Pentastomida. In: MINELLI, RUFFO & LA POSTA, Checklist delle specie della fauna italiana, 28: 49.

Reperto - Tre esemplari raccolti su *Caretta caretta* (Linnaeus, 1758) (Reptilia Testudinidae) spiaggiata il 12.V.1997 presso Lido di Savio (RA) con carapace lungo (metodo curvilineo)

220 mm e del peso di 1,01 kg. L'esemplare è stato raccolto dal Corpo Forestale dello Stato, che si ringrazia, in evidente debilitazione ed è poi morto poco dopo la consegna per un'occlusione gastrica da corpo estraneo. Gli ectobionti raccolti, per la specie in questione, misuravano, dalla base del capitolo scapo all'apice delle valve, 53, 42 e 28 mm e si presentavano inseriti insieme in area caudale. Erano anche presenti sul carapace vari esemplari di *Chelonibia testudinaria* (Linnaeus, 1758). Esemplari conservati nella collezione D. Scaravelli presso il Museo di Scienze Naturali di Cesena.

Osservazioni - Non citato in ZANGHERI (1966, Mem. Mus. civ. St. nat. Verona, f.s., 1 (1): 517) dove per la Romagna comunque sono segnalate solo specie raccolte presso le acque salmastre della Pineta di Ravenna. Taxon frequente sui Cheloni nel Mediterraneo (RELINI, 1980, Guide per il riconoscimento delle specie animali delle acque lagunari e costiere italiane, C.N.R., 2: 88) e soprattutto su *C. caretta* (cfr. FRAZIER et al., 1985, Marine ecol., 6 (2): 127-140) dove si insedia preferibilmente, come nel caso riscontrato, sul margine posteriore sopracaudale del carapace (cfr. GRAMENTZ, 1988, Naturalista sicil., S. IV, 12 (1-2): 33-46).

Dino Scaravelli
Museo di Scienze Naturali, piazza P. Zangheri 6 - 47023 Cesena (FO)
Alessandro Bortolotto & Marco Affronte
Fondazione Cetacea, via Milano 63 - 47036 Riccione (RN)

29 - *Stomatolepas elegans* (O.G. Costa, 1838) (Crustacea Thoracica Balanidae)

ARGANO et al., 1995, Crustacea Maxillopoda, Pentastomida. In: MINELLI, RUFFO & LA POSTA, Checklist delle specie della fauna italiana, 28: 50.

Reperto - Gruppo di esemplari raccolti su *Caretta caretta* (Linnaeus, 1758) (Reptilia Testudinidae) femmina spiaggiata già morta il 20.IX.1996 presso Casal Borsetti (RA) con carapace lungo (metodo curvilineo) 520 mm e del peso di 14 kg circa. L'esemplare è stato raccolto dal Corpo Forestale dello Stato, che si ringrazia, in avanzata decomposizione e morto molto probabilmente per annegamento. Gli ectobionti raccolti si concentravano in gruppi di circa 25-30 esemplari insediati sulla pelle del collo, verso l'inserzione degli arti, su entrambi i lati, con dimensioni variabili tra i 5 e gli 8 mm. Presenti sul carapace anche vari esemplari di *Chelonibia testudinaria* (Linnaeus, 1758). Esemplari conservati nella collezione dell'autore presso il Museo di Scienze Naturali di Cesena.

Osservazioni - Non citato in ZANGHERI (1966, Mem. Mus. civ. St. nat. Verona, f.s., 1 (1): 517). Questo cirripede sembrerebbe abbastanza frequente sui Cheloni nel Mediterraneo (RELINI, 1980, Guide per il riconoscimento delle specie animali delle acque lagunari e costiere italiane, C.N.R., 2: 88) e già citato per *C. caretta* nelle aree centro ed est mediterranee (cfr. FRAZIER et al., 1985, Marine ecol., 6 (2): 127-140) ma non per il canale di Sicilia (cfr. GRAMENTZ, 1988, Naturalista sicil., S. IV, 12 (1-2): 33-46).

Dino Scaravelli
Museo di Scienze Naturali, piazza P. Zangheri, 6 - 47023 Cesena (FO)

30 - *Chalcolestes parvidens* (Artobolevski, 1929) (Insecta Odonata Lestidae)

COBOLLI, UTZERI, DE MATTHAEIS & DELL'ANNA, 1994, Atti XVII Congresso nazionale italiano di Entomologia, Udine: 77-82.

Reperti - Bagnacavallo (RA), Area di Riequilibrio ecologico Podere Pantaleone, ai margini dello stagno, 22.X.1998, 1 ♂, leg. e coll. R. Fabbri, osservati altri 2 exx. ♂♂.

Osservazioni - Seconda stazione romagnola conosciuta dopo Punte Alberete (LOHMANN, 1993, Notul. odonatol., 4: 4-6; TERZANI, ROMANO & CARFÌ, 1994, Boll. Soc. ent. ital., 126 (2): 99-120) di specie con distribuzione turanico-europea nota dell'Italia centro-meridionale e nel nord del solo Veneto e Romagna (UTZERI et al., Notulae Odonatologicae, 4: 46-50). Sia a Punte Alberete, dove è abbondantissima, sia nell'oasi Podere Pantaleone convive con *Chalcolestes viridis* (Vander Linden, 1825); nei due biotopi le entità non sembrano mostrare separazione degli orari di attività come osservato a Roma (COBOLLI et al., op. cit.). Il piccolo stagno ubicato nell'Area di Riequilibrio di Bagnacavallo è artificiale e fu escavato nel 1994.

31 - *Erythromma viridulum* (Charpentier, 1840) (Insecta Odonata Coenagrionidae)

UTZERI, 1995, Odonata. In: MINELLI, RUFFO & LA POSTA (eds.), Checklist delle specie della fauna italiana, 35: 3.

Reperti - Ravenna, Punte Alberete, 16.VI.1997, 1 ♂, foto di E. Contarini; ibidem, 9.VI.1998, 1 ♂ e avvistati vari tandem, leg. e coll. R. Fabbri; ibidem, 19.VII.1998, 2 ♂♂ e 1 ♀ e avvistati vari tandem, leg. e coll. idem; ibidem, 24.VIII.1998, 1 ♂, leg. e coll. idem.

Osservazioni - Prima citazione per la Romagna di specie distribuita nel Mediterraneo ed Asia centrale, diffusa in tutta Italia ma di non facile reperimento siccome generalmente vola bassa sulla superficie dell'acqua e distante dalla riva (TERZANI, 1986, Atti Mus. civ. Stor. nat. Grosseto, 7-8: 33-51).

32 - *Brachytron pratense* (Müller, 1764) (Insecta Odonata Aeshnidae)

UTZERI, 1995, Odonata. In: MINELLI, RUFFO & LA POSTA (eds.), Checklist delle specie della fauna italiana, 35: 4.

Reperti - S. Alberto (RA), Valli di Comacchio, Valle Furlana, loc. Scorticata, 19.IV.1996, 1 ♂, leg. R. Fabbri (coll. Museo St. Nat. Ferrara); Ravenna, Pineta S. Vitale, Scolo Rivalone, 2.V.1996, 1 ex., leg. e coll. G. Pezzi.

Osservazioni - Entità dell'Europa e Vicino Oriente, non ancora nota con certezza per la Romagna (TERZANI, ROMANO & CARFÌ, 1994, Boll. Soc. ent. ital., 126 (2): 99-120), presente nell'Italia settentrionale e sporadicamente nel centro sud, dotata di fenologia immaginale precoce.

33 - *Aeshna isosceles* (Müller, 1767) (Insecta Odonata Aeshnidae)

UTZERI, 1995, Odonata. In: MINELLI, RUFFO & LA POSTA (eds.), Checklist delle specie della fauna italiana, 35: 4.

Reperti - Meldola (FO), Bosco di Scardavilla, 26.VI.1998, 1 ♂, leg. e coll. R. Fabbri.

Osservazioni - Primo rinvenimento certo per la Romagna (TERZANI, ROMANO & CARFÌ, 1994, Boll. Soc. ent. ital., 126 (2): 99-120) di specie diffusa in Europa centro-meridionale, Vicino Oriente ed in tutta Italia ma non comune.

34 - *Libellula fulva* Müller, 1764 (Insecta Odonata Libellulidae)

UTZERI, 1995, Odonata. In: MINELLI, RUFFO & LA POSTA (eds.), Checklist delle specie della fauna italiana, 35: 5.

Reperti - Meldola (FO), Bosco di Scardavilla, 26.VI.1998, 1 ♂, leg. e coll. R. Fabbri; Ravenna, Punte Alberete, 9.VI.1998, 1 ♀, leg. e coll. R. Fabbri.

Osservazioni - Riportata per gran parte dell'Italia, mancavano dati certi per la Romagna (TERZANI, ROMANO & CARFÌ, 1994, Boll. Soc. ent. ital., 126 (2): 99-120) per questa specie dell'Europa centro-meridionale e Vicino Oriente (D'AGUILAR et al., 1990, Guida delle Libellule d'Europa e del Nord Africa).

35 - *Selysiotthemis nigra* (Vander Linden, 1825) (Insecta Odonata Libellulidae)

UTZERI, 1995, Odonata. In: MINELLI, RUFFO & LA POSTA (eds.), Checklist delle specie della fauna italiana, 35: 6.

Reperti - Marina Romea (RA), nel retroduna, 24.VII.1998, 1 ♂, leg. L. Landi (coll. R. Fabbri).

Osservazioni - Prima segnalazione per la Romagna di specie del Mediterraneo ed Asia centrale, nota per l'Emilia, Umbria, Lazio, Puglia, Sicilia e Sardegna (CARCHINI, ROTA & UTZERI, 1985, Fragm. Entomol., 18 (1): 91-103; D'ANTONIO, 1987, Boll. Soc. ent. ital., 119 (2): 124). Probabilmente il suddetto reperto è dovuto al ritrovamento di un individuo erratico.

Roberto Fabbri
Museo Civico di Storia Naturale
via De' Pisis, 24 - 44100 Ferrara

36 - *Eretes sticticus* (Linnaeus, 1776) (Insecta Coleoptera Dytiscidae)

FRANCISCOLO, 1979, Coleoptera Haliplidae, Gyrinidae, Hygrobiidae, Dytiscidae, Fauna d'Italia, XIV, Ed. Calderini: 622.

Reperti - Villanova di Bagnacavallo (RA), 11.X.1997, 1 ♂ immaturo, leg. e coll. G. Pezzi.

Osservazioni - Diffuso in quasi tutte le regioni tropicali e subtropicali del mondo, si trova qua e là nell'Italia meridionale ed insulare; molto più raro al centro e sporadico al nord, dove non era ancora stato segnalato per la Romagna. L'esemplare è stato trovato la sera alla luce di un lampione.

Fernando Pederzani
via Landoni, 35 - 48100 Ravenna
Giorgio Pezzi
via Ariosto, 5 - 48020 Villanova di Bagnacavallo (RA)