

Adelmo Usvelli

**25 ANNI DI RICERCHE ENTOMOLOGICHE  
A BADIA DELLA VALLE, MARRADI (FI)  
III. COLEOTTERI CURCULIONIDI**

(Insecta Coleoptera Curculionoidea)

**Riassunto**

Elenco dei Coleotteri Curculionidi raccolti dall'autore nell'alta valle Acerreta, presso Badia della Valle, Marradi (Firenze) nel corso degli ultimi 25 anni. La lista comprende 244 specie, pari al 12,7 % delle specie italiane.

**Abstract**

*[Results of 25 years' entomological researches at Badia della Valle near Marradi (Florence province): III. Curculionid beetles]*

A list of Curculionid beetles collected by the author during 25 years in the upper Acerreta valley, at Badia della Valle, near Marradi (Florence province) on the northern slope of Apennines, therefore in biogeographical Romagna. 244 species of weevils are reported, being the 12.7 % of Italian Curculionoidea.

Key-words: Coleoptera, Curculionoidea, Rhynchitidae, Attelabidae, Apionidae, Curculionidae, Dryophthoridae, Acerreta, Badia della Valle, Marradi.

**Premessa**

La presente nota continua la serie dedicata alle mie raccolte entomologiche nell'alta valle Acerreta, nei dintorni di Badia della Valle, presso Marradi (FI), effettuate durante più di 25 anni. Nella prima nota, dedicata ai Macrolepidotteri (USVELLI, 2002), ho fornito notizie generali ed alcuni riferimenti bibliografici sull'area studiata. Per le necessarie informazioni preliminari invito perciò il lettore a consultare quel lavoro. Nella seconda nota (USVELLI, 2003) ho trattato i Coleotteri Cerambicidi. Questo terzo contributo riporta la lista dei Coleotteri Curculionidi con l'evidenziazione dei reperti di maggiore importanza.

## Lista sistematica

### RHYNCHITIDAE

#### ***Byctiscus***

*betulae* (Linné, 1758)

*populi* (Linné, 1758)

#### ***Lasiorhynchites (Lasiorhynchites)***

*olivaceus* (Gyllenhal, 1833)

*praeustus* (Boheman, 1845)

#### ***Lasiorhynchites (Coccigorrhynchites)***

*sericeus* (Herbst, 1797)

#### ***Neocoenorrhinus***

*abellei* (Desbrochers, 1868)

*aequatus* (Linné, 1767)

*germanicus* (Herbst, 1797)

#### ***Rhynchites***

*auratus* (Scopoli, 1763)

*bacchus* (Linné 1758)

#### ***Involvolus***

*caeruleus* (De Geer, 1775)

### ATTELABIDAE

#### ***Attelabus***

*nitens* (Scopoli, 1763)

#### ***Apoderus***

*coryli* (Linné, 1758)

### APIONIDAE

#### ***Ceratapion***

*onopordi* (Kirby, 1808)

#### ***Diplapion***

*stolidum* (Germar, 1817)

*detritum* (Mulsant & Rey, 1858)

#### ***Aspidapion***

*aeneum* (Fabricius, 1775)

*radiolus* (Marsham, 1802)

#### ***Squamapion***

*vicinum* (Kirby, 1808)

*flavimanum* (Gyllenhal, 1833)

#### ***Kalcapion***

*semivittatum* (Gyllenhal, 1833)

#### ***Pseudapion***

*rufirostre* (Fabricius, 1775)

#### ***Malvapion***

*malvae* (Fabricius, 1775)

#### ***Rhopalapion***

*longirostre* (Olivier, 1807)

#### ***Exapion***

*difficile* (Herbst, 1797)

*fuscirostre* (Fabricius, 1775)

#### ***Pseudoprotapion***

*astragali* (Paykull, 1800)

#### ***Protapion***

*filirostre* (Kirby, 1808)

*nigritarse* (Kirby, 1808)

*fulvipes* (Fourcroy, 1785)

*varipes* (Germar, 1817)

*apricans* (Herbst, 1797)

*assimile* (Kirby, 1808)

*trifolii* (Linné, 1768)

*ruficroides* (Schatzmayr, 1925)

*ononicola* (Bach, 1854)

#### ***Pseudoperapion***

*brevirostre* (Herbst, 1797)

#### ***Pseudostenapion***

*simum* (Germar, 1817)

#### ***Perapion***

*curtirostre* (Germar, 1817)

*violaceum* (Kirby, 1808)

#### ***Apion***

*frumentarium* (Linné, 1758)

#### ***Catapion***

*seniculus* (Kirby, 1808)

*pubescens* (Kirby, 1811)

*jaffense* (Desbrochers, 1870)

#### ***Stenopterapion***

*tenue* (Kirby, 1808)

*intermedium* (Eppelsheim, 1875)

#### ***Ischnopterapion***

*virens* (Herbst, 1797)

*loti* (Kirby, 1808)

#### ***Holotrichapion***

*pisi* (Fabricius, 1801)

#### ***Hemitrichapion***

*reflexum* (Gyllenhal, 1833)  
*pavidum* (Germar, 1817)  
*waltoni* (Stephens, 1829)

**Pirapion**

*immune* (Kirby, 1808)

**Cyanapion**

*gyllenhali* (Kirby, 1808)

*spencii* (Kirby, 1808)

**Oxystoma**

*pomona* (Fabricius, 1798)

**Eutrichapion**

*gribodoi* (Desbrochers, 1896)

*punctigerum* (Paykull, 1792)

*viciae* (Paykull, 1800)

**CURCULIONIDAE**

**Dodecasticus**

*dalmatinus lauri* Stierlin, 1861

**Cirorrhynchus**

\**falzonii* F.Solari, 1947

**Otiorrhynchus (Otiorrhynchus)**

*caudatus* (Rossi, 1792)

*armadillo* (Rossi, 1792)

**Otiorrhynchus (Zustalestus)**

*rugosostratus* (Goeze, 1777)

**Otiorrhynchus (Aranihus)**

*frescati* Boheman, 1843

*ligneus* (Olivier, 1807)

**Otiorrhynchus (Metopiorrhynchus)**

*cyclophthalmus* F.Solari, 1946

*vernalis* Stierlin, 1861

**Otiorrhynchus (Normotionus)**

*sulcatus* (Fabricius, 1775)

**Otiorrhynchus (Acunotus)**

*lutosus* Stierlin, 1858

**Otiorrhynchus (Pocodalemes)**

*crataegi* Germar, 1824

**Otiorrhynchus (Arammichnus)**

*cribricollis* Gyllenhal, 1834

**Simo**

*hirticornis* (Herbst, 1795)

**Pseudomyllocerus**

*neapolitanus* (Pic, 1901)

**Phyllobius (Parnemoicus)**

*subdentatus* Bohemann, 1843

ssp. *roboretanus* Gredler, 1892

**Phyllobius (Phyllobius)**

*etruscus* Desbrochers, 1873

*pyri* (Linné, 1758)

*longipilis* Boheman, 1843

**Phyllobius (Nemoicus)**

*oblongus* (Linné, 1758)

**Polydrusus (Metallites)**

*marginatus* Stephens, 1831

**Polydrusus (Conocetus)**

*kahri* Kirsch, 1865

**Polydrusus (Eustolus)**

*cervinus* (Linné, 1758)

**Polydrusus (Chrysoyphis)**

*frater* (Rottenberg, 1871)

*sericeus* (Schaller, 1783)

**Polydrusus (Polydrusus)**

*sparsus* Gyllenhal, 1834

*transalpinus* K.Daniel & J.Daniel, 1906

**Liophloeus**

*tessulatus* (Müller, 1776)

**Sciaphilus**

*asperatus* (Bonsdorff, 1785)

**Brachysomus**

*hirtus* Boheman, 1845

**Stasioidis**

*parvulus* (Fabricius, 1792)

**Strophosoma (Strophosoma)**

*melanogrammum* (Forster, 1771)

**Strophomorphus**

*porcellus* (Schönherr, 1832)

**Sitona**

*lineatus* (Linné, 1758)

*cambricus* Stephens, 1831

*lepidus* (Gyllenhal, 1832)

*regensteiniensis* (Herbst, 1797)

*cylindricollis* (Fåhraeus, 1840)

*suturalis* Stephens, 1831

*macularius* (Marsham, 1802)

*sulcifrons argutulus* (Gyllenhal, 1834)

\**waterhousei* (Walton, 1846)

*hispidulus* (Fabricius, 1777)  
*humeralis* Stephens, 1831  
*striatellus* (Gyllenhal, 1834)  
*puncticollis* Stephens, 1831  
***Tanymecus (Tanymecus)***  
*palliatu*s (Fabricius, 1787)  
***Mecaspis***  
*alternans* (Herbst, 1795)  
***Pseudocleonus***  
*grammicus* (Panzer, 1789)  
***Rabdorrhynchus***  
*varius* (Herbst, 1795)  
***Cyphocleonus***  
*trisulcatus* (Herbst, 1795)  
***Cleonis***  
*pigra* (Scopoli, 1763)  
***Lixus (Ortholixus)***  
*acicularis* (Germar, 1824)  
*angustus* (Herbst, 1795)  
***Lixus (Compsolixus)***  
*albomarginatus* (Boheman, 1843)  
*junci* Boheman, 1836  
***Lixus (Dilixellus)***  
*angustatus* (Fabricius, 1775)  
*punctiventris* Boheman, 1836  
*cribricollis* Boheman, 1836  
*vilis* (Rossi, 1790)  
***Lixus (Epimeces)***  
*filiformis* (Fabricius, 1781)  
***Larinus (Larinus)***  
*brevis* (Herbst, 1795)  
***Larinus (Phyllonomeus)***  
*sturnus* (Schaller, 1783)  
*turbinatus* Gyllenhal, 1836  
***Larinus (Larinomesius)***  
*scolymi* (Olivier, 1808)  
*obtusus* Gyllenhal, 1836  
***Rhinocyllus***  
*conicus* (Frölich, 1792)  
***Hypera***  
*zoilus* (Scopoli, 1763)  
*striata* (Boheman, 1834)  
*postica* (Gyllenhal, 1813)

*\*ononidis* (Chevrolat, 1863)  
*nigrirostris* (Fabricius, 1775)  
*venusta* (Fabricius, 1781)  
*meles* (Fabricius, 1792)  
*plantaginis* (De Geer, 1775)  
***Donus***  
*\*brucki* (Capiomont, 1868)  
***Limobius***  
*borealis* (Paykull, 1792)  
***Lepyrus***  
*palustris* (Scopoli, 1763)  
*capucinus* (Schaller, 1783)  
***Hylobius (Callirus)***  
*abietis* (Linné, 1758)  
***Liparus (Liparus)***  
*coronatus* (Goeze, 1777)  
*dirus* (Herbst, 1795)  
***Plinthus***  
*findeli* Boheman, 1842  
*squalidus granulipennis* (Fairmaire, 1852)  
***Aparopion***  
*costatum* (Fåhraeus, 1843)  
***Echinomorphus***  
*ravouxi* (Jacquet, 1888)  
***Pissodes***  
*castaneus* (De Geer, 1775)  
***Magdalis (Panus)***  
*barbicornis* (Latreille, 1804)  
***Magdalis (Porrothus)***  
*cerasi* (Linné, 1758)  
***Magdalis (Magdalinus)***  
*armigera* (Fourcroy, 1785)  
***Magdalis (Odontomagdalis)***  
*rufa* (Germar, 1824)  
*memnonia* (Gyllenhal, 1837)  
***Acalles***  
*aubei* Boheman, 1837  
*\*micros* Dieckmann, 1982  
***Echinodera (Ruteria)***  
*hypocrita* (Boheman, 1837)  
***Rhinoncus***  
*pericarpus* (Linné, 1758)  
*perpendicularis* (Reich, 1797)

***Pelenomus***

*\*velaris* (Gyllenhal, 1827)

***Ceutorhynchus***

*contractus* (Marsham, 1802)

*erysimi* (Fabricius, 1787)

*fallax* Boheman, 1845

*assimilis* (Paykull, 1792)

*floralis* (Paykull, 1792)

*atomus* Boheman, 1845

*picitarsis* Gyllenhal, 1837

*fulvitaris* Gougelet & H.Brisout, 1860

*sulcicollis* (Paykull, 1800)

*pallidactylus* (Marsham, 1802)

***Calosirus***

*terminatus* (Herbst, 1795)

***Glocianus***

*distinctus* (C.Brisout, 1870)

***Stenocarum***

*cardui* (Herbst, 1784)

***Phrydiuchus***

*\*topiarius* (Germar, 1824)

***Mogulones***

*\*euphorbiae* (C.Brisout, 1866)

*geographicus* (Goeze, 1777)

***Microplontus***

*campestris* (Gyllenhal, 1837)

***Trichosirocalus***

*rufulus* (Dufour, 1851)

*troglydytes* (Fabricius, 1787)

***Zacladus***

*exiguus* (Olivier, 1807)

***Coeliodes***

*angulipennis* F.Solari, 1940

*ruber* (Marsham, 1802)

***Orobitis***

*cyaneus* (Linné, 1758)

***Coryssomerus***

*capucinus* (Beck, 1817)

***Baris***

*timida* (Rossi, 1792)

*analis* (Olivier, 1790)

*coerulescens* (Scopoli, 1763)

*\*morio* (Boheman, 1844)

***Anthonomus (Anthonomus)***

*pomorum* (Linné, 1758)

*pedicularius* (Linné, 1758)

*piri* Kollar, 1837

*rubi* (Herbst, 1795)

*terreus* Gyllenhal, 1836

***Bradybatus (Bradybatus)***

*creutzeri* Germar, 1824

*kellneri* Bach, 1854

***Bradybatus (Nothops)***

*\*elongatulus* (Boheman, 1843)

***Curculio (Curculio)***

*elephas* (Gyllenhal, 1836)

*pellitus* (Boheman, 1843)

*venosus* (Gravenhorst, 1807)

*nucum* Linné, 1758

*glandium* Marsham, 1802

*\*propinquus* (Desbrochers, 1868)

***Tychius (Tychius)***

*quinquepunctatus* (Linné, 1758)

*polylineatus* (Germar, 1824)

*cuprifer* (Panzer, 1799)

*schneideri* (Herbst, 1795)

*meliloti* Stephens, 1831

*flavus* Becker, 1864

*stephensi* Schönherr, 1836

*longicollis* C.Brisout, 1862

*argentatus* Chevrolat, 1859

*picrostris* (Fabricius, 1787)

*pusillus* Germar, 1842

*squamulatus* Gyllenhal, 1836

***Sibinia***

*viscaria* (Linné, 1761)

***Dorytomus (Dorytomus)***

*longimanus* (Forster, 1771)

*schonherri* Faust, 1882

***Pachytychius***

*haematocephalus* (Gyllenhal, 1836)

*sparsutus* (Olivier, 1807)

***Smicronyx (Smicronyx)***

*Jungermanniae* (Reich, 1797)

*reichi* (Gyllenhal, 1836)

*pygmaeus* Curtis, 1840

***Bagous (Abagous)***  
*lutulentus* (Gyllenhal, 1813)  
***Rhynchaenus (Rhynchaenus)***  
*pilosus* (Fabricius, 1781)  
***Orchestes (Salius)***  
*fagi* (Linné, 1758)  
***Pseudorchestes***  
*\*persimilis* (Reitter, 1911)  
*pratensis* (Germar, 1821)  
***Mecinus***  
*pyraster* (Herbst, 1795)  
*janthinus* (Germar, 1817)  
*circulatus* (Marsham, 1802)  
***Miarus***  
*graminis* (Gyllenhal, 1813)  
***Gymnetron (Gymnetron)***  
*\*aper* Desbrochers, 1893  
*labile* (Herbst, 1795)  
*pascuorum* (Gyllenhal, 1813)

*rostellum* (Herbst, 1795)  
*\*stimolosum* (Germar, 1821)  
*variabile* Rosenhauer, 1856  
***Gymnetron (Rhinusa)***  
*tetrum* (Fabricius, 1792)  
*netum* (Germar, 1821)  
*linariae* (Panzer, 1792)  
*antirrhini* (Paykull, 1800)  
*\*herbarum* H.Brisout, 1862  
***Cionus***  
*olens* (Fabricius, 1792)  
*longicollis montanus* Wingelmüller, 1914

## DRYOPHTHORIDAE

***Sphenophorus***  
*striatopunctatus* (Goeze, 1777)  
***Sitophilus***  
*granarius* (Linné, 1758)  
*oryzae* (Linné, 1763)

Le specie meno comuni, che si ritrovano solo in alcune regioni italiane, sono contrassegnate da un asterisco.

## Specie endemiche della fauna italiana

***Dodecasticus***  
*dalmatinus lauri* Stierlin, 1861  
***Cirorrhynchus***  
*falzonii* F.Solari, 1947  
***Otiorrhynchus (Metopiorrhynchus)***  
*cyclophthalmus* F.Solari, 1946  
*vernalis* Stierlin, 1861  
***Pseudomylocerus***  
*neapolitanus* (Pic, 1901)  
***Phyllobius (Phyllobius)***  
*etruscus* Desbrochers, 1873  
*longipilis* Boheman, 1843

***Polydrusus (Chrysoyphis)***  
*frater* (Rottenberg, 1871)  
*sericeus* (Schaller, 1783)  
***Polydrusus (Polydrusus)***  
*transalpinus* K.Daniel & J.Daniel, 1906  
***Donus***  
*brucki* (Capiomont, 1868)  
***Coeliodes***  
*angulipennis* F.Solari, 1940

## Conclusioni

Le 244 specie di Curculionidi rinvenute a Badia della Valle rappresentano il 12,70 % della curculionidofauna italiana. Pur essendo un buon numero e costituendo un

campione significativo della curculionidofauna dell'alta valle Acerreta, rappresentano probabilmente solo una parte delle specie che vivono nella zona. Infatti le ricerche condotte finora hanno interessato soprattutto le specie dei prati e quelle attratte dalla luce. Con l'uso di trappole specifiche ed una più accurata ricerca sulle varie piante ospiti, si dovrebbero trovare ancora molti altri taxa, anche di grande interesse.

## Ringraziamenti

Ringrazio l'amico Fabio Talamelli (San Giovanni Marignano, Rimini) per la determinazione o il controllo della maggior parte dei reperti.

## Bibliografia

- ABBAZZI P., COLONNELLI E., MASUTTI L., & OSELLA G., 1995 - Coleoptera Polyphaga XVI (Curculionoidea): In: MINELLI A., RUFFO S. & LA POSTA S. (eds.) - Checklist delle specie della fauna italiana. *Calderini*, Bologna, 61: 1-68.
- ABBAZZI P., & OSELLA G., 1992 - Elenco sistematico faunistico degli Anthribidae, Rhinomaceridae Attelebidae, Apionidae Brentidae, Curculionidae, italiani (Insecta, Coleoptera, Curculionoidea). II parte. *Redia*, 76 (1): 179-221.
- ALONZO-ZARAZAGA M.A.A., & C.H.C., 1999 - A world catalogue of families and genera of Curculionoidea (Insecta: Coleoptera). *Entomopraxis*, Barcellona: 1-315.
- PORTA A., 1932 - Fauna Coleopterorum Italica. *Stab. Tip. Piacentino*, Piacenza, 5: 1-336 (Curculionidae).
- TALAMELLI F., 1995 - Coleotteri Apionidae e Curculionidae nuovi per l'Emilia-Romagna (Insecta Coleoptera Apionidae, Curculionidae). *Quaderno di Studi e Notizie di Storia naturale della Romagna*, 4: 33-46.
- TALAMELLI F., 1997 - *Baris atricolor* (Boheman, 1844) in Italia e nuove segnalazioni di Curculionoidea per la Romagna (Insecta Coleoptera Curculionoidea). *Quaderno di Studi e Notizie di Storia naturale della Romagna*, 8: 63-68.
- USVELLI A., 2002 - 25 anni di ricerche entomologiche a Badia della Valle, Marradi (Firenze). I. Macrolepidotteri. *Quaderno di Studi e Notizie di Storia naturale della Romagna*, 17: 61-76.
- USVELLI A., 2003 - 25 anni di ricerche entomologiche a Badia della Valle, Marradi (Firenze). II. Coleotteri Cerambicidi. *Quaderno di Studi e Notizie di Storia naturale della Romagna*, 18: 57-62.
- ZANGHERI P., 1969 - Repertorio sistematico e topografico della flora e della fauna vivente e fossile della Romagna. *Mem. Mus. civ. St. nat. Verona*, f.s., 1 (4): 1415-1963.

---

Indirizzo dell'autore:

Adelmo Usvelli  
via Giangrandi, 2  
I - 48018 Faenza (RA)