

Segnalazioni: Botanica

3 - *Tulipa australis* Link (Monocotyledones, Liliiflorae, Liliaceae)

Pignatti S., 1992: Flora d'Italia, Edagricole. vol. III: 357-358.

Reperto: Firenzuola (FI) Monte Beni 1200 m slm, il 28.V.1995.

Popolamento infeudato tra le rocce ofiolitiche nel versante sud-sud-ovest in prossimità della cima consociato a *Genista radiata*. Immagini conservate presso gli autori.

Osservazioni: prima segnalazione per la Romagna. Specie ad ampia distribuzione mediterranea e montana, presente sulle Alpi occidentali e centrali e nella catena appenninica. Nota dell'isola d'Elba, non indicata per le estreme regioni meridionali ed insulari. Indicata per l'Emilia in stazioni montane oltre i 1000 m ed in stazioni collinari su serpentini: Pietra Parcella e Monte delle Tane (PC), Prinzera, Groppo di Gorro, Groppi Rossi (PR); Alessandrini A., 1993, Le ofioliti dell'Appennino emiliano: 97.

Elisa Landi

via S. Vitale, 16 - 48020 S. Agata sul Santerno (RA)

Francesco Cappelli

Via Matteotti, 63 - 47017 Rocca San Casciano (FO)

4 - *Origanum heracleoticum* Linné (Dicotyledones, Tubiflorae, Labiatae)

Fiori A., 1923-29. Nuova Flora Analitica d'Italia. Edagricole, vol. II:456.

Pignatti S., 1982. Flora d'Italia. Edagricole, vol. II:486-487.

Zangheri P., 1966. Repertorio sistematico e topografico della flora e fauna vivente e fossile della Romagna, Mus. Civ. St. Nat. di Verona, Memorie fuori serie n. 1:367.

Zangheri P., 1976. Flora italiana, CEDAM, vol. II:574.

Reperto: Rocca S. Casciano (FO) 230 m slm, il 3.VIII.1995. Esemplare unico, cresciuto in mezzo alla ghiaia, ai bordi della provinciale Rocca S. Casciano - S. Zeno. Esemplari d'erbario sono conservati presso l'autore.

Osservazioni: Fiori riporta, a livello di sottospecie di *Origanum vulgare* Linné, l'*O. hirtum* Link, segnalato per Venezia (isola S. Andrea) e per le Marche (Pesaro e Senigallia). Anche Zangheri, nel suo Repertorio della Flora e Fauna della Romagna riporta *O. vulgare ssp. hirtum* (Link, 1822) segnalato per S. Giovanni in Galilea (FO) su sfaticcio di roccia calcarea in luglio-agosto.

Nelle flore di Pignatti e Zangheri la ssp. *hirtum* è elevata al rango di specie col nome *heracleoticum* Linné; trattasi dell'«origano meridionale» che nel sud d'Italia fornisce il ben noto condimento aromatico. È specie a distribuzione mediterranea, segnalata da Pignatti per l'Italia meridionale ed isole maggiori, ma anche del Lazio, Toscana, Marche ed Appennino romagnolo sebbene da confermare.

Con il presente ritrovamento se ne conferma la presenza in Romagna.

Francesco Cappelli

via Matteotti, 63 - 47017 Rocca S. Casciano (FO)